

Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Medicina Humana



TESIS

**“FACTORES ASOCIADOS A DESARROLLO DE LEIOMIOMA
UTERINO, USUARIAS DEL SERVICIO DE GINECO-
OBSTETRICIA, HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO, 2019”**

Presentado por: Edwar Ticona Ccahuantico

Para Optar el Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor: Dr. Nicolás Edgardo Mauricio Agurto

Cusco, Marzo del 2020

RESUMEN

“FACTORES ASOCIADOS A DESARROLLO DE LEIOMIOMA UTERINO, USUARIAS DEL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA, HOSPITAL REGIONAL DE CUSCO, 2019”

Ticona E, Mauricio N

Introducción: El leiomioma uterino es el tumor benigno más frecuente, aproximadamente entre 30% a 70% de incidencia a nivel mundial, en mujeres mayores de 35 años hasta la perimenopausia; más frecuente en la raza negra. Puede causar complicaciones como sangrado anormal, dolor pélvico, infertilidad y llevar a pacientes cada vez más jóvenes a la histerectomía. El siguiente trabajo de investigación se realizó en el servicio de Gineco-Obstetricia, Hospital Regional del Cusco, 2019.

Objetivo: Determinar los factores asociados a desarrollo de leiomioma uterino, usuarias del Servicio de Gineco-Obstetricia, Hospital Regional de Cusco, 2019.

Métodos: Estudio tipo descriptivo, transversal y retrospectivo. No se calculó la muestra debida a que la población es finita (204 pacientes con el diagnóstico de leiomioma en el 2019), se excluyeron 56 historias clínicas, por tanto se trabajó con 148 historias clínicas.

Resultados: El intervalo de 30 a 50 años representan el 85.81% ($X^2=9,961 - p=0.013$), el 58.78% presentó antecedente familiar ($X^2=1,092 - p=0,007$), el 62.84% fueron usuarias de los anticonceptivos orales ($X^2=3,457 - p=0,010$), el 50.68% presentaron menarquia precoz ($X^2=4,512 - p=0.003$), el 54.73% presentó ciclo menstrual irregular ($X^2=1,550 - p=0.000$), el 52.03% de las pacientes fueron nulíparas ($X^2=1,470 - p=0.008$), el 67.57% presentó sobrepeso y obesidad ($X^2=1,436 - p=0.000$), el 56.76% de las pacientes presentaron antecedente de diabetes mellitus tipo 2 ($X^2=2,458 - p=0.019$), el 62.16% de las pacientes presentaron antecedente de hipertensión arterial ($X^2=1,569 - p=0.001$).

Conclusión: Hay asociación estadísticamente significativa ($p < 0,05$), es decir que las variables estudiadas son factores de riesgo para el desarrollo del leiomioma uterino.

Palabras clave: Leiomioma, factores asociados, paridad, ciclo menstrual, anticonceptivos orales