

Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco

Facultad de Ciencias de la Salud

Escuela Profesional de Medicina Humana



TESIS

**FACTORES ASOCIADOS A EFUSION PLEURAL EN PACIENTES CON
NEUMONIA, HOSPITAL ANTONIO LORENA, CUSCO, 2013 - 2018**

Para optar el título profesional de Médico Cirujano

Presentado por: José Alejandro Cuba Herrera

Asesor: DR. Yuri Ponce de León Otazu

Cusco 2020

RESUMEN

El presente estudio de investigación cuyo título es “Factores asociados a efusión pleural en pacientes con neumonía en el hospital Antonio Lorena, Cusco, 2013 – 2018” cuyo objetivo es analizar cuáles son los factores asociados a efusión pleural en pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía, hospital Antonio Lorena, Cusco, 2013 – 2018. De acuerdo a la metodología seguida la clase de estudio fue observacional (también denominado no experimental) porque no se interfirió en el trabajo, transversal por una sola medición y análisis de las variables llamado analítico.

Se tomó un total de 112 historias clínicas contando como antecedente haber presentado efusión pleural y la muestra que fue calculada con fórmula matemática obteniendo 86 pacientes diagnosticados con esta enfermedad, los datos obtenidos fueron registrados en una ficha de recolección de datos.

Resultados: El 62 % tiene se encuentra en edad crítica ya sea mayor de 60 años o menor de 5 años, 58 % son del sexo masculino, 46 % del sexo femenino, 98 % es de religión católica, 67% es de estrato o nivel socioeconómica medio, 88 % tiene un grado de instrucción entre primaria y secundaria y 69 % es de procedencia rural. De acuerdo al uso o abuso de tabaco y alcohol en el estudio se encuentra aproximadamente que 62.8 % tiene tendencia a fumar y 47.8 % consume ya sea moderada o excesivamente el alcohol; el 22.9 % tiene antecedente de diabetes, 28.5 % tiene enfermedad obstructiva pulmonar, 27.5 % tiene antecedente de malnutrición, el 64.2 % recibió tratamiento previo con antibióticos, 72.2 % tuvo menos de 5 días de hospitalización, 25.243 % tuvo un antecedente más anterior de efusión pleural, 74.6 % tuvo una proteína C reactiva elevado, 68.8 % tuvo una presencia de células de estirpe de plaquetas elevadas y 67.7 % presento elevación de estirpe blanca o leucocitosis.

Conclusiones: los factores que se encontró en el trabajo que están asociados a la complicación de la efusión pleural en pacientes con diagnostico confirmado o certero de neumonía son consumo o antecedente que el paciente de alcohol, consumo o abuso de sustancia como el tabaco, enfermedad obstructiva pulmonar como antecedente, inmunosupresión de antecedente, malnutrición como un antecedente muy importante, antecedente de cirugía de tórax previa y antecedente de vacunación antineumocica.

Palabras clave: factor relacionado, enfermedad de efusión pleural, neumonía como patología, empiema como complicación importante, complicación de la patología e inflamación - infección.