

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE MEDICINA HUMANA

ESCUELA PROFESIONAL DE MEDICINA HUMANA



Tesis

**PREVALENCIA DEL TRASTORNO DEPRESIVO Y FACTORES ASOCIADOS
EN LA POBLACION ADULTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO,
2023**

Presentado por: Bach. Sherly Diana Dalens Condori

Para optar al Título Profesional de Médico Cirujano

Asesor: MC. Jorge Luis Cabezas Limaco

Cusco, Perú

2023

INFORME DE ORIGINALIDAD

(Aprobado por Resolución Nro.CU-303-2020-UNSAAC)

El que suscribe, asesor del trabajo de investigación/tesis titulado: Prevalencia del trastorno depresivo y factores asociados en la población adulta del distrito de Santiago - W. C. O., 2023.
presentado por: Sherly Diana Daluis Condori
con Nro. De DNI: 70395915, para optar el título profesional/grado académico de Medico Cirujano
Informo que el trabajo de investigación ha sido sometido a revisión por 2 veces, mediante el Software Antiplagio, conforme al Art. 6° del Reglamento para Uso de Sistema Antiplagio de la UNSAAC y de la evaluación de originalidad se tiene un porcentaje de 97

Evaluación y acciones del reporte de coincidencia para trabajos de investigación conducentes a grado académico o título profesional, tesis

Porcentaje	Evaluación y Acciones	Marque con una (X)
Del 1 al 10%	No se considera plagio.	X
Del 11 al 30 %	Devolver al usuario para las correcciones.	
Mayor a 31%	El responsable de la revisión del documento emite un informe al inmediato jerárquico, quien a su vez eleva el informe a la autoridad académica para que tome las acciones correspondientes. Sin perjuicio de las sanciones administrativas que correspondan de acuerdo a Ley.	

Por tanto, en mi condición de asesor, firmo el presente informe en señal de conformidad y **adjunto** la primera hoja del reporte del Sistema Antiplagio.

Cusco, 14 de agosto de 20 23


.....
JORGE LUIS CABEZAS LIMACO
.....
MEDICO PSIQUIATRA
.....
C.M.P 29941 - R.N.E. 18144
Firma

Post firma..... Jorge Luis Cabezas Limaco.

Nro. De DNI..... 23 90 30 9 8

ORCID del Asesor..... 0000 - 0002 - 0823 - 3146.

Se adjunta:

1. Reporte generado por el Sistema Antiplagio.
2. Enlace del Reporte Generado por el Sistema Antiplagio: 27259: 2520 69614

NOMBRE DEL TRABAJO

PREVALENCIA DEL TRASTORNO DEPRESIVO Y FACTORES ASOCIADOS EN LA POBLACION ADULTA DEL DISTRITO DE SANT

RECUENTO DE PALABRAS

27989 Words

RECUENTO DE CARACTERES

150769 Characters

RECUENTO DE PÁGINAS

112 Pages

TAMAÑO DEL ARCHIVO

5.5MB

FECHA DE ENTREGA

Aug 12, 2023 5:08 PM GMT-5

FECHA DEL INFORME

Aug 12, 2023 5:10 PM GMT-5**● 9% de similitud general**

El total combinado de todas las coincidencias, incluidas las fuentes superpuestas, para cada base de datos

- 8% Base de datos de Internet
- Base de datos de Crossref
- 8% Base de datos de trabajos entregados
- 0% Base de datos de publicaciones
- Base de datos de contenido publicado de Crossref

● Excluir del Reporte de Similitud

- Material bibliográfico
- Material citado
- Material citado
- Coincidencia baja (menos de 20 palabras)

RESUMEN

“PREVALENCIA DEL TRASTORNO DEPRESIVO Y FACTORES ASOCIADOS EN LA POBLACION ADULTA DEL DISTRITO DE SANTIAGO – CUSCO, 2023”

OBJETIVO: Determinar la prevalencia del trastorno depresivo y los factores asociados en la población adulta del distrito de Santiago, 2023

MATERIALES Y MÉTODOS: Fue un estudio no experimental, transversal, correlacional y analítico, cuya muestra estuvo constituida por 264 personas adultas asistentes a los Centros de Salud del Distrito. La recolección de datos fue mediante el Inventario de depresión de Beck y una ficha de recolección de datos. Las variables se analizaron mediante frecuencias absolutas y relativas; para evaluar la asociación entre la depresión y las variables independientes, se calcularon razones de prevalencia (RP) con intervalos de confianza del 95 % y en el análisis multivariado se aplicó regresión logística binaria.

RESULTADOS: El análisis descriptivo se obtuvo que la prevalencia del trastorno depresivo en la población del distrito de Santiago fue 43,6%. Según el grado de depresión, el 18.2 % tenía depresión leve, el 15.5% tenía depresión moderada y el 9.8 % tenía de depresión grave. En cuando al análisis bivariado, se determinó que los factores de riesgo fueron: sexo femenino (RP=1.45), no tener empleo (RP= 1.5), haber tenido un evento vital estresante en los últimos 12 meses (RP= 1.63), tener una comorbilidad (RP=1.79), no tener el número adecuado de horas de sueño (RP=3.01), haber tenido una experiencia traumática en la infancia (RP=2.17), antecedentes familiares de depresión (RP=1.50), haber padecido de violencia familiar (RP=1.81) y no tener buenas relaciones familiares (RP=2.24).

CONCLUSIONES: Los factores de riesgo asociados significativamente con el trastorno depresivo fueron no tener empleo (RP= 1.5), no tener el número adecuado de horas de sueño (RP=3.01) y no tener buenas relaciones familiares (RP=2.24), mientras que el factor protector asociado significativamente fue no haber tenido experiencias traumáticas en la infancia (RP= 0.46)

PALABRAS CLAVE: Trastorno depresivo, Trastorno depresivo mayor, adulto.